

NACERLATINOAMERICANO

<http://www.nacerlatinoamericano.org>

<http://www.nacerlatinoamericano.com>

The Seventh American College of Chest Physicians Guidelines for the antenatal and peripartum management of thrombophilia: A tutorial.

[Dorit Blickstein MD](#); [American College of Chest Physicians](#).

Obstet Gynecol Clin N Am 33 (2006) 499-505.

Guías para el manejo antenatal y periparto de las Trombofilia: Un tutorial.

INTRODUCCION:

El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad de la sangre, debido a cambios fisiológicos de la coagulación y de los sistemas fibrinolíticos. Ellos explicarían parte de los abortos recurrentes, el retardo de crecimiento intrauterino y la pre eclampsia. Ellas tienen a su vez incrementado, el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, por lo tanto se verían beneficiadas con el tratamiento preventivo ya sea con Heparina y/o aspirina en bajas dosis (1) En septiembre del 2004, el Colegio Americano de Médicos Del Tórax, publicó las últimas recomendaciones para prevenir tromboembolismos venosos durante el embarazo y en el postparto. En la siguiente tabla se resumen las opciones de tratamiento (PM = Peso Molecular).

REGIMEN	DOSIS
Mini dosis heparina no frac.	SC, 5000 U q 12 hs.
Moderada dosis heparina	SC, q 12 hs.
Dosis ajustada de Heparina	SC, q12 hs según TP.
Profilaxis con Heparina de bajo PM.	SC, Enoxaparin, 40 mg/día
Dosis intermedia de Heparina de bajo PM	SC, Enoxaparine, 40 mg/12 hs.
Dosis ajustada de Heparina de bajo PM.	Enoxaparina, 1 mg/kg/12hs
Posparto	Warfarina

Recomendación I

Trombosis Venosa Profunda + Factor de riesgo transitorio

- Rigurosa observación
- Con factor de riesgo. Anticoagulantes antenatales
- Anticoagulantes posparto

Recomendación II

Episodio simple de Trombosis Venosa Profunda Idiopática.

Este documento es un instrumento de información, que no reemplaza al personal médico en el cuidado de la salud y no es responsable directa ni indirectamente del posible daño causado a terceros.

- Rigurosa observación.
- Mínima a moderada dosis de Heparina no fraccionada.
- Profilaxis con Heparina bajo PM.
- Anticoagulantes posparto.

Recomendación III

Episodio de Trombosis venosa profunda +fuerte
Historia familiar de Trombofilia

- Mínima a moderada dosis de Heparina no fraccionada
- Profilaxis con Heparina de bajo PM
- Anticoagulantes posparto

Recomendación IV

Episodio de trombosis venosa profunda simple + alto
Riesgo de Trombofilia

- Moderada dosis de Heparina no fraccionada
- Dosis intermedias de Heparina de bajo PM
- Anticoagulantes posparto

Recomendación V

Sin episodio de Trombosis Venosa profunda +
Trombofilia

- Rigurosa observación
- Dosis mínima de Heparina no fraccionada
- Profilaxis con Heparina de bajo PM
- Anticoagulantes posparto

Recomendación VI

Sin episodio de Trombosis venosa profunda +alto
Riesgo de trombofilia

- Dosis moderada de Heparina no fraccionada
- Dosis intermedia de Heparina de bajo PM
- Anticoagulantes posparto

Recomendación VII

Múltiples episodios de Trombosis venosa
Profunda y/o anti coagulación por largo tiempo

- Dosis ajustadas de Heparina no fraccionada ajustada Según tiempos
- Dosis ajustada según peso, de Heparina de bajo PM
- Anticoagulantes posparto

BIBLIOGRAFIA:

Este documento es un instrumento de información, que no reemplaza al personal médico en el cuidado de la salud y no es responsable directa ni indirectamente dl posible daño causado a terceros.

- 1-** Greer IA. Thrombophilia: implications for pregnancy outcome. Thromb Res. 2003 Jan 25;109(2-3):73-81

Este documento es un instrumento de información, que no reemplaza al personal médico en el cuidado de la salud y no es responsable directa ni indirectamente del posible daño causado a terceros.